

Ασκήσεις - 3ο Φυλλάδιο

1. Εξετάστε αν οι παρακάτω προτάσεις είναι αληθείς ή ψευδείς. Θεωρήστε ότι οι V και W είναι δ.χ. πεπερασμένης διάστασης (επί ενός σώματος \mathbb{K}) και L μια απεικόνιση από τον V στον W .
- (α') Αν η L είναι γραμμική, τότε διατηρεί τα αθροίσματα και τα βαθμωτά γινόμενα.
 - (β') Αν $L(x + y) = L(x) + L(y)$, τότε η L είναι γραμμική.
 - (γ') Η L είναι 1-1 αν και μόνον αν $\ker(L) = \{0\}$.
 - (δ') Αν η L είναι γραμμική, τότε $L(0_V) = 0_W$.
 - (ε') Αν η L είναι γραμμική, τότε $\dim(\ker(L)) + \dim(\text{im}(L)) = \dim(W)$.
 - (ζ') Αν η L είναι γραμμική, τότε απεικονίζει γραμμικά ανεξάρτητα υποσύνολα του V πάνω σε γραμμικά ανεξάρτητα υποσύνολα του W .
 - (ζ') Αν $L, T : V \rightarrow W$ είναι γραμμικές απεικονίσεις και συμφωνούν σε μια βάση του V , τότε $L = T$.
 - (η') Δεδομένων $x_1, x_2 \in V$ και $y_1, y_2 \in W$, υπάρχει γραμμική απεικόνιση $L : V \rightarrow W$, τέτοια ώστε $L(x_1) = y_1$ και $L(x_2) = y_2$.
2. Για τις ακόλουθες απεικονίσεις L αποδείξτε ότι είναι γραμμικές και βρείτε βάσεις των $\ker(L)$ και $\text{im}(L)$. Στη συνέχεια υπολογίστε τις διαστάσεις των $\ker(L)$ και $\text{im}(L)$, και επιβεβαιώστε ότι ισχύει το Θεώρημα της διάστασης. Χρησιμοποιήστε κατάλληλα κριτήρια για να ελέγχετε αν η L είναι 1-1 και επί.
- (α') $L : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $L(x_1, x_2, x_3) = (x_1 - x_2, 2x_3)$.
 - (β') $L : M_{2 \times 3}(\mathbb{R}) \rightarrow M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$, $L \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2a_{11} - a_{12} & a_{13} + 2a_{12} \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$
 - (γ') $L : \mathbb{P}_2(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{P}_3(\mathbb{R})$, $L(p(x)) = xp(x) + p'(x)$.
3. Δίνεται η γραμμική απεικόνιση $L : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ με $L(x, y) = (ax + by, cx + dy)$. Δείξτε ότι η L είναι 1-1 αν και μόνο αν $ad \neq bc$. Γενικότερα, αποδείξτε ότι η γραμμική απεικόνιση $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ με
- $$T(x_1, x_2, \dots, x_n) = (a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n, \dots, a_{n1}x_1 + \dots + a_{nn}x_n)$$
- είναι 1-1 αν και μόνο αν η ορίζουσα του πίνακα $A = (a_{ij})_{i,j=1,\dots,n}$ είναι διάφορη του μηδενός.
4. Δίνεται η γραμμική απεικόνιση $L : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$ με $L(x, y, z, w) = (x - y, x + y + z, y + w)$. Βρείτε μια βάση του πυρήνα $\ker(L)$, καθώς και τη διάσταση και μια βάση της εικόνας $\text{im}(L)$.

5. Έστω V και W δ.χ. και $L : V \rightarrow W$ γραμμική απεικόνιση.
- (α) Αποδείξτε ότι η L είναι 1-1 αν και μόνο αν απεικονίζει γραμμικά ανεξάρτητα υποσύνολα του V σε γραμμικά ανεξάρτητα υποσύνολα του W .
- (β) Υποθέστε ότι η L είναι 1-1 και έστω $S \subseteq V$. Αποδείξτε ότι το S είναι γραμμικά ανεξάρτητο αν και μόνο αν το $T(S)$ είναι γραμμικά ανεξάρτητο.
6. Έστω V ένας δ.χ. επί ενός σώματος \mathbb{K} και μια γραμμική απεικόνιση $T : V \rightarrow V$. Δείξτε ότι $T^2 = 0 \Leftrightarrow \text{im}(T) \subset \ker(T)$.
7. Έστω V ένας δ.χ. επί ενός σώματος \mathbb{K} και μια γραμμική απεικόνιση $T : V \rightarrow V$. Δείξτε ότι $\ker(T) \cap \text{im}(T) = \{0\} \Leftrightarrow (T^2(v) = 0 \Rightarrow T(v) = 0)$.