

Ασκήσεις - 6ο Φυλλάδιο

1. Εξετάστε αν οι παρακάτω προτάσεις είναι αληθείς ή ψευδείς.
 - (α') Τπάρχει γραμμικός τελεστής T που δεν έχει κανένα T -αναλλοίωτο υπόχωρο.
 - (β') Αν T είναι ένας γραμμικός τελεστής σε ένα διαν. χώρο πεπερασμένης διάστασης V και W είναι ένας T -αναλλοίωτος υπόχωρος του V , τότε το χαρακτηριστικό πολυώνυμο του T_W διαιρεί το χαρακτηριστικό πολυώνυμο του T .
 - (γ') Έστω T ένας γραμμικός τελεστής σε ένα διαν. χώρο πεπερασμένης διάστασης V , και $x, y \in V$. Αν W είναι ο T -κυκλικός υπόχωρος που παράγεται από το x και W' είναι ο T -κυκλικός υπόχωρος που παράγεται από το y , και $W = W'$, τότε $x = y$.
 - (δ') Αν T είναι ένας γραμμικός τελεστής σε ένα διαν. χώρο πεπερασμένης διάστασης V , τότε για κάθε $x \in V$ ο T -κυκλικός υπόχωρος που παράγεται από το x είναι ο ίδιος με τον T -κυκλικό υπόχωρο που παράγεται από το $T(x)$.
 - (ε') Έστω T ένας γραμμικός τελεστής σε ένα διαν. χώρο διάστασης n . Τότε υπάρχει ένα πολυώνυμο $g(t)$ βαθμού n τέτοιο ώστε $g(T) = T_0$, όπου T_0 είναι το μηδενικό πολυώνυμο.
 - (ζ') Κάθε πολυώνυμο της μορφής $(-1)^n(a_0 + a_1t + \dots + a_{n-1}t^{n-1} + t^n)$ είναι το χαρακτηριστικό πολυώνυμο κάποιου γραμμικού τελεστή.
2. Έστω T ένας γραμμικός τελεστής σε ένα διαν. χώρο πεπερασμένης διάστασης V . Αποδείξτε ότι οι ακόλουθοι υπόχωροι είναι T -αναλλοίωτοι:
 - α) $\{0\}$ και V .
 - β) $\ker(T)\}$ και $\text{im}(T)$.
 - γ) E_λ , για κάθε ιδιοτιμή λ του T .
3. Έστω T ένας γραμμικός τελεστής σε ένα διαν. χώρο V , και W είναι ένας T -αναλλοίωτος υπόχωρος του V . Αποδείξτε ότι ο W είναι $g(T)$ -αναλλοίωτος για κάθε πολυώνυμο $g(t)$.
4. Έστω T ένας γραμμικός τελεστής σε ένα διαν. χώρο V . Αποδείξτε ότι η τομή οποιασδήποτε συλλογής T -αναλλοίωτων υπόχωρων του V είναι T -αναλλοίωτος υπόχωρος.
5. Για κάθε γραμμικό τελεστή T σε ένα διαν. χώρο V βρείτε μια βάση του T -κυκλικού υπόχωρου W , που παράγεται από το z :
 - α) $V = \mathbb{R}^4$, $T(a, b, c, d) = (a+b, b-c, a+c, a+d)$, και $z = e_1$.
 - β) $V = M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$, $T(A) = A^T$, και $z = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

Στη συνέχεια υπολογίστε το χαρακτηριστικό πολυώνυμο του T_W και το χαρακτηριστικό πολυώνυμο $f(t)$ του T . Επιβεβαιώστε ότι το χαρακτηριστικό πολυώνυμο του T_W διαιρεί το $f(t)$.

6. Έστω διαν. χώρος V , $T \in \mathcal{L}(V)$, $0 \neq x \in V$ και W είναι ο T -κυκλικός υπόχωρος που παράγεται από το x . Για κάθε $y \in V$ αποδείξτε ότι $y \in W$ αν και μόνο αν υπάρχει ένα πολυώνυμο $g(t)$ τέτοιο ώστε $y = g(T)(x)$.

7. Έστω A ο $n \times n$ πίνακας με στοιχεία στο \mathbb{R}

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 & -a_0 \\ 1 & 0 & \dots & 0 & -a_1 \\ 0 & 1 & \dots & 0 & -a_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & -a_{k-2} \\ 0 & 0 & \dots & 1 & -a_{k-1} \end{pmatrix}$$

όπου $a_0, a_1, \dots, a_{k-1} \in \mathbb{R}$. Αποδείξτε ότι το χαρακτηριστικό πολυώνυμο του A είναι:

$$(-1)^n(a_0 + a_1t + \dots + a_{k-1}t^{k-1} + t^k).$$

(Τιπόδειξη: Χρησιμοποιήστε επαγωγή στο k , και αναπτύξτε την ορίζουσα ως προς την πρώτη γραμμή.)

8. Έστω πίνακας $A \in M_{2 \times 2}(\mathbb{C})$ με χαρακτηριστικό πολυώνυμο $f(t) = t^2 + t + 1$. Δείξτε ότι $A^3 = I_2$.